

Số: /UBND-NN  
V/v Tăng cường chỉ đạo phòng  
chống rét trong nuôi trồng thủy  
sản vụ Đông Xuân 2023-2024

Trường Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

Kính gửi: - BCD phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản;  
- Tiểu BCD sản xuất các thôn, cùng toàn thể nhân dân.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết từ tháng 12/2023 và đầu năm 2024 hiện tượng rét đậm, rét hại sẽ xảy ra tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi.

Thực hiện Công văn số 3610/ UBND-NN, ngày 14/12/2023, của UBND huyện Nông Công V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản vụ Đông Xuân 2023-2024.

Để chủ động phòng chống rét, giảm thiểu thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản, Chủ tịch UBND xã đề nghị BCD phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản cùng toàn thể nhân dân làm tốt một số nội dung sau.

**1. Đối với các đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm.**

Các đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, nhất là đối tượng chịu rét kém như cá lóc, cá rô phi, tôm,... nên bố trí thu hoạch sớm để đảm bảo an toàn.

**2. Đối với cá giống, thủy sản nuôi chưa đạt kích cỡ thương phẩm.**

**\* Áp dụng các biện pháp chống rét như sau:**

- Duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu 1,5-2,0 m.
- Thả bè nổi trên mặt ao chiếm 1/2 đến 2/3 diện tích ao nuôi.
- Thả sọt tránh rét cho cá ở góc phía bắc của ao nuôi, sử dụng các sọt đan bằng tre nứa, đưa vào sọt các búi rơm tạo giá thể để cá trú ẩn tránh rét.
- Những cơ sở có điều kiện có thể làm khung và che phủ bề mặt ao bằng nilon sáng màu để ngăn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt cho nước ao nuôi.

**\* Chăm sóc đàn thủy sản nuôi:**

- Thời điểm trước khi rét đến cần tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho cá để cá khỏe, có sức đề kháng với bệnh tật và tăng khả năng chống chịu được với thời tiết lạnh kéo dài bằng cách cho cá ăn đầy đủ thức ăn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Cho ăn đầy đủ, sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, bổ sung Vitamin C và khoáng chất để tăng sức đề kháng.

- Khi nhiệt độ nước xuống dưới 18<sup>o</sup>C, nên giảm 1/2 lượng thức ăn cho cá ăn. Khi nhiệt độ nước xuống thấp dưới 14<sup>o</sup>C cần ngừng cho cá ăn. Khi nhiệt độ từ 14<sup>o</sup>C trở lên, tranh thủ cho cá ăn vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, bổ sung thêm vitamin C vào thức ăn nhằm tăng sức đề kháng cho cá. Khi nhiệt độ nước dưới 12<sup>o</sup>C

thì ngừng cho ăn, vào thời điểm nắng ấm trong ngày có thể cho ăn bằng thức ăn tinh hoặc thức ăn chế biến.

- Định kỳ 2 lần/tháng sát khuẩn môi trường nước bằng vôi bột, với hàm lượng 1 – 2 kg vôi bột/100m<sup>2</sup>.

- Hàng ngày theo dõi chất lượng nước, không đưa các loại phân xuống ao làm ảnh hưởng xấu đến môi trường nước. Bổ sung lượng nước cần thiết để đảm bảo độ sâu theo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, theo dõi sức khỏe của đối tượng nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời. Không kéo lưới kiểm tra hoặc thu tỉa khi thời tiết rét đậm, rét hại.

Vậy đề nghị BCD phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản xã, Tiểu BCD sản xuất các thôn cùng toàn thể nhân dân quán triệt thực iện tốt ./.

**Nơi nhận:**

- Phòng NN&PTNT;
- Như kính gửi;
- Đài truyền thanh
- Lưu: Vt.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**